



Reisemedizin ONLINE
kostenpflichtiger Impfcheck

osir.ch

Fragestellungen

bestehen Impfplücken
vor der 14 tägigen Reise
nach Südafrika?

MBMPAfoBi21032024

MPA Fortbildung 21.03.2024



Der Reisende surft auf osir.ch,
füllt das WEB Formular aus und mailt die Impfeinträge mit.

Der Arzt überprüft den Impfausweis auf Vollständigkeit und mailt
die Empfehlungen gemäss Seite 3 :

Impfstatus

() *vollständig* (x) *unvollständig*

Malariatabletten

(x) *vorbeugend empfohlen*
(*Krügerpark September bis Mai!*)

Weitere Infos **LINKLISTE**
Malariakarte

Hausarzt verabreicht Ihnen die Impfungen
Dort beziehen Sie die Malariamedikamente
führen sie das Formular IMPFUPDATRE OSIR mit sich

kein Hausarzt:

Termin vereinbaren bei Reisemediziner oder Tropenarzt

Impfung Vaccination Vaccinazione	Impfstoff/Vaccin/Vacc. (Hersteller, Lot-Nr.) (Fabricant, no du lot) (Produttore, no del lotto)	Datum Date Data
Kinderlähmung Poliomyélite Poliomielite	Poloral Sab.	22.10.96 20.12.96 21. 2.97
	Poloral Sab.	15.09.98
MB 22.08.96 Südafrika		
Diphtherie Diphthérie Difterite	DTPa Infanrix	22.10.96 20.12.96 21. 2.97
	DTPa Infanrix	15.09.98
	Starrkrampf Tétanos Tetano	
	Keuchhusten Coqueluche Pertosse	
ple/Combinata o singola	Infanrix-DTPa *IPV	19.5.03
	Td-Pur 0,5ml	17.1.12

Kombiniert oder e	Masern Rougeole Morbilli	Triviraten	17.11.97
Mumps Oreillons Orecchioni	Röteln Rubéole Rubeola	MHR-II	19.5.03
Haemophilus influenzae	Hib-titer		20.10.96 21.12.96 20. 2.97
	Hib-titer		17.11.97
		Zeckenimpf.	23.4.18
Andere/Autres/Altre	FSME-Immun 0,25 ml Junior Lot: VNR1A07A Baxter		10.1.07 7.2.07
	FSME-Immun 0,25 ml Junior Lot: VNR1G06B Baxter		4.1.08
	Engerix B-20		17.1.12 18.6.12

re/Autres/Altre	HPV	Cervarix® Lot: AHPVA111AC	15.12.2011 16.1.2012
	HPV	Cervarix® Lot: AHPVA111AC	23.7.2012

Name / Geb.datum Destination(en)	MB geb. 22.08.1996 Süd Afr 2 Wo Ende 2023	IMPUPDATE	OSIR Ostschweizer Infostelle für Reisemedizin Dr. Gallus Heeb 9000 St.Gallen BAG-Empfehlungen Schweiz	Impf- dosen Impf- büchlein	Impfemp- feh- lung ja nein	wirksam bis
Datum	21.03.2024					
Kinderlähmung Polio IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix DTPa-IPV / Infanrix DTPa-IPV+Hib Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV Tetravac DiTPa IPV <i>Pentavac</i> OPV alte (orale)Polio Lebend Impfstoffe	IPV Mériex Poliorix DTPa-IPV Hib HBV dTpa-IPV dT IPV DTPaIPV <i>-(Hib)</i> Sabin, Salk, Poloral trivalent	ab 2019: 2 + 1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 12.Mon 4-7J 11-15J 25J 45J 65J bis 2019: 3+1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7J. 11-15J. /25J./45J.				
Diphtherie (D) Starrkrampf (T) Keuchhusten (P) Infanrix DTPa-IPV / Infanrix DTPa-IPV+Hib Infanrix Hexa - , Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Tetravac (Pentavac) Revaxis frühere (alte) Tetanus Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTpa IPV dTpa dTpa DTPa IPV (DTPa IPV Hib) dT IPV T dT DTP	25 Jahre- 65.J.: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon / 4-7Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J. 2 Mon / 4 Mon./12 Mon / 4-7Jahre ab 5 Jahren				
Rotaviren Rotarix	RV1	2 Mon. / 4 Mon. (max. - 23Wo 6 Tage)				
Covid- 19 Moderna BioNTech/Pfizer	Booster für Gefährdete	Vor Reisen - siehe IATA Vorgaben https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm				
Masern MumpsRöteln Priorix, MM-RVAXPRO, Pluserix früher verimpft: Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln)	Ma Mu Rö	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. Für nach 1963 geborene Personen				
Varizellen Varilrix Varivax	VZV	2 Dosen: ab 9 Mon. /12 Mon. Bis maximal 40. Geburtstag				
Masern Mumps Röteln -Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö VZV	2 Dosen: ab 9 Mon. / 12 Mon. Bis maximal 40. Geb. tag.				
FSME EncepurN EncepurN Kinder* FSME-immunCC FSME Imm.junior*	FSME Zeckenhirnhautentzündung Auffrischimpfung alle 10 Jahre	ab 12.Geb.tag / 1-3 M./ 9-12 M ab 16. Geb.tag/ 1-3 M./ 5-12 M. *Kinderdosen ab 1. Geb.tag				
Humane Papilloma Viren Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.				
Hepatitis B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa, Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)				
Meningitis Meningokokken Menveo MenQuadfi Nimenrix (Menjugate Meningetec Neis Vac) Bexsero	Serogruppen ACWY (früher Serogruppe C) Serogruppe B	ab 2 J. (bis 5J.); 11-15 J. (-20Geb.Tag) Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 J für „Risikogruppen“, 2 Dosen				
Pneumokokken Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15	ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)				
Herpes Zoster Shingrix, (Zostavax)	HZ	ab 65 Jahren 2 Dosen				
Grippeimpfung		jährlich ab Oktober				
Gelbfieber Stamaril, Arilvax	in Afrika, Südamerika nicht in Asien und Europa	1 Dosis, (maximal 2 Dosen), ab vollendetem 9. Monat; nach 10 Jahren evtl. 2. Dos.				
Hepatitis A+B Twinrix 720/20	HAV +HBV	1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)				
Hepatitis A Havrix 1440E, Havrix 720E	HAV	ab 19.Geb.tag 2 Dosen1440 (0/ 6 Mon.) 1.-19. Geb.tag 2 Dosen 720 (0/ 6 Mon.)				
Tollwut Rabipur, Tollwut Sanofi ! beschränkte Verfügbarkeit	VorderReise 2 Dosen(0/7 -28 Tage) bei Bedarf 3. Dosis nach 12 Mon.	Nach Tierbiss: 4 Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)				
Typhus Vivotif 3 Kps. Typhim vi	> 4 Wo in Hochrisikogebieten					
Japanische Enzephalitis Ixiaro	seltener empfohlen, 2 Dosen	! beschränkte Verfügbarkeit				
Denguefieber Qdenga (Affepocken), (Ebola)	Qdenga Impfung empfohlen nur bei Reisenden > 4 J. alt mit früher durchgemachter Dengue Erkrankung					
SCHUTZMASSNAHMEN MALARIA KARTE	Mückenschutz wichtig!					
LINKS REISEMEDIZIN OSIR						C: OSIR Dr.G.Heeb 6.3.24 2024

LOESUNG

FORMULAR IMPFUPDATE MB 22.08.96

Destination-en	Südafrika	2 Wo Ende Dez. 2023	Empfehlungen BAG	Impf-dosen Im pf-büchlein	Impfemp-fehlung ja nein	wirksam bis
Datum	6.9.2023	OSIR Dr.med. Gallus Heeb 9000 St.Gallen Poststr. 12				
Kinderlähmung Polio IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix Infanrix Hib /InfanrixHexa Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV *IPV Mérieux Tetravac DiTPa IPV <i>Pentavac</i> OPV alte (orale)Polio Lebend Impfstoffe	IPV IPV Mérieux, Priorix DTPa-IPV Hib HBV 1 2012 dtpa-IPV dT IPV *IPV DTPaIPV -(Hib) Sabin, Trivalent, Salk, Poloral 4 98	ab 2019: 2 + 1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 12 Mon. 4-7 J./ bis 2019 3 + 1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7 J./	5	Ja 1 Dosis Revaxis		
Diphtherie (D) Starrkrampf (T) Keuchhusten (P) Infanrix Infanrix - Hexa, Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Revaxis Tetravac (Pentavac) frühere (alte) Tetanus Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) 4 DTPa-IPV (Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTPa IPV dTpa dTPa5 dT IPV DTPaIPV (DTPaIPV/Hib) T dT DTP	25 Jahre- 65.J.: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 2 Mon / 4 Mon./12 Mon / 4-7 Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J. ab > 5. Jahr 2 Mon. / 4 Mon/ 12 Mon/ 4-7 J.	6	Siehe oben		
Covid- 19 mRNA Spikevax Moderna mRNA Comirnaty BioNTech/Pfizer	2 Dosen 0 1 Mo 2 Dosen 0 4 Wo	ab 12y: 2 Dosen 0 4 Wo Booster: 4 Mon. nach 2. Impfg ab (5)-12y: 2 Dosen 0 / 4 Wo Booster: 4 Mon. nach 2. Impfg	?		gemäss IATA https://osir.ch/covid-19/	
Masern Mumps Röteln Priorix M-M-RVaxPro Measles Vac. live	Ma2 Mu1 Rö2 Moraten (Masern); Erevox Röteln)	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geb. Personen	2	1 Dosis Priorix möglich		
Varizellen Varilrix Varivax	VZV	2 Dosen: 9 Mon. /12 Mon. 13. Mon. - 40 Geb. tag	0	nein		
Masern Mumps Röteln -Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö VZV	2 Dosen: 9 Mon. /12 Mon. 13. Mon. - 40. Geb. tag.	0	nein		
FSME EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.junior	FSME Zeckenhirnhautentzündung	ab 12.Geb.tag /16. Geb.tag 3x Kinderdosen ab 1. Geb.tag Auffrischimpfung alle 10 Jahre	4	nein	2028	
Humane Papilloma Viren Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.	3	nein		
Hepatitis B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)	2	nein		
Meningitis Meningokokken Menveo MenQuadfi Nimenrix (Menjgate Meningotec Neis Vac) Bexsero	Serogruppen ACWY Serogruppe C Serogruppe B	ab 24 Monaten; Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 Jahre 2 Dosen, für Risikogruppen	0	nein		
Pneumokokken Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15	ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)	0	nein		
Herpes Zoster Shingrix, (Zostavax)	HZ	ab 65 Jahren 2 Dosen	0	nein		
Grippeimpfung		jährlich empfohlen	0	nöglich		
Gelbfieber Stamaril, Arilvax	YF Afrika, Südamerika nicht in Asien und Europa	1 Dosis, (maximal 2 Dosen), ab dem 9. Monat, (nach 10 Jahren 2. Dosis)	0	Nein!		
Hepatitis A+B Twinrix 720/20	HAV +HBV	1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)	0	nein		
Hepatitis A Havrix 1440E, Havrix 720E	HAV	ab 19.Geb.tag 2 Dosen 1440 (0/ 6-Mon.) 1.-19. Geb.tag 2 Dosen 720 (0/ 6Mon.)	0	Ja! Ha- vrix 1440		
Tollwut Rabipur, Tollwutimpfstoff Mérieux	Vor der Reise 2 Dosen (0/7 bis 28 T.) bei Bedarf 3. Dosis nach 12 Monaten	Nach Tierbiss: 4 Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)	0	Tierbiss Arzt!		
Typhus Vivotif 3 Kps. Typhim vi	> 4 Wo in Hochrisikogebieten		0	nein		
Japanische Encephalitis Ixiaro	selten empfohlen, 2 Dosen		0	nein		
Qdenga (Dengue), Affenpocken, Ebola	nach Rücksprache mit Zentrum		0	nein		
MALARIA Mückenschutz wichtig	Krüger Park : Malaria tabl vorbeugend				C: OSIR Dr.G.Heeb 16.07.2023	
LINKS REISEMEDIZIN OSIR https://osir.ch/wp-content/uploads/LINKS1-rmfuerreisende2022.pdf	Bitte beachten!					

Grundimpfungen

Allgemeine IMPFUNGEN

POLIO (Kinderlähmung)

5 Dosen erhalten, **die letzte vor > 10J.**
Impfstatus nicht okay vor einer Reise nach Afrika!

(bei Reisen in gewisse Länder sind Polio Nachholimpfungen empfohlen, wenn die letzte Impfung mehr als 10 Jahre zurückliegt.

(Revaxis, Boostrix Polio oder IPV Merieux)

(1 Jahr für ganz spezielle Länder bei Aufenthalt von > 4 Wochen)

Diphtherie TETANUS Pertussis

6 Dosen erhalten, Impfstatus ok

MMR M2Mu1 R02.

VZV möglich, falls nicht erkrankt

COVID-19

Die IATA Seite gibt Auskunft über die Auflagen der Zieldestination

Hepatitis B 2 Dosen geimpft Impfstatus okay

HPV Impfstatus okay

FSME 4 Dosen erhalten, Impfstatus ok. Boosterimpfungen dann alle 10y!

LINKS

Polio Booster (WHO):

<https://polioeradication.org/this-week/>

Für welche Länder Covid Impfung?

<https://bit.ly/3LXYSKr>

12.9.2023

Reiseimpfungen

GELBFIEBER nicht empfohlen

TOLLWUT nicht empfohlen

Schutzmassnahmen gegen Tollwut werden in jeder reisemed. Konsultation angesprochen.

2 Dosen vor der Reise möglich.


Bei Tierbiss wäre ein Arzt/ eine Klinik aufzusuchen. Es bräuchte dann 4 Dosen eines Tollwutimpfstoffes, zu beginnen in Südafrika!

Hep A 1 Dosis Havrix 1440 vor der Reise empfohlen. 2. Dosis nach 6-12 Monaten.

Typhus nicht empfohlen

Es existiert ein Impfstoff (Vivotif Kapseln) mit einem ca. 50% igen Schutz gegen die Krankheit für ca. 1 Jahr. Bei längeren Reisen unter suboptimalen hygienischen Bedingungen in Ländern mit höherem Typhusrisiko kann diese Impfung empfohlen werden 3 Wochen vor der Abreise. Für diese Reise trifft das nicht zu.

Malaria: Mückenschutz wichtig, Malariatbl **vorbeugend im Dez. Januar**
Siehe Malariakarte, Quelle ECTM



LINKS

<https://osir.ch/malariaphylaxe/>

<https://osir.ch/gelbfieber/>

<https://osir.ch/tollwut/>

<https://osir.ch/dengue-chikungunya-zika/>

<https://osir.ch/wp-content/uploads/malaria-vorkommen.pdf>

c: OSIR Dr. G. Heeb 9016 St.Gallen