



Covid-19: Übersicht über die Testtypen

	PCR-Test Nasen-Rachen-Raum oder Speichel	Gepoolter Speichel- PCR-Test (gemischte Proben)	Antigen-Schnelltest Nasen-Rachen-Raum	Antigen-Schnelltest Nase	Selbsttest Nase
<i>Durchführung der Analyse</i>	Labor	Labor	Vor Ort (z.B. Apotheke)	Vor Ort (z.B. Apotheke)	Irgendwo
<i>Probeentnahme</i>	Fachperson	Jedermann	Spezifisch geschulte Person	Spezifisch geschulte Person	Jedermann
<i>Bereits validierte Tests vorhanden</i>	Ja	Ja	Ja	Ja (bisher 1 Test validiert)	Nein
<i>Verlässlichkeit</i>	Sehr hoch	Hoch	Hoch	Bei Symptomen gut; Ohne Symptome voraussichtlich niedriger	Bei Symptomen gut; Ohne Symptome voraussichtlich niedriger
<i>Einsatzgebiet</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Personen mit Symptomen – Risikopersonen – Gesundheitsfachpersonen – Personen mit positivem Schnell- oder Selbsttest 	Repetitive Tests: Z.B. <ul style="list-style-type: none"> – Unternehmen – Schulen – Belegschaft Altersheim – Sportverein 	<ul style="list-style-type: none"> – Personen mit Symptomen – Repetitive Tests – Im Umfeld besonders gefährdeter Personen (z.B. Altersheimbesucher) – Bedarfstestung z.B. in Apotheken 	<ul style="list-style-type: none"> – Testung auf Wunsch z.B. in Apotheken – Repetitive Tests möglich, falls ausreichend gute Tests auf dem Markt 	<ul style="list-style-type: none"> – Testung auf Wunsch zu Hause – Repetitive Tests möglich, falls ausreichend gute Tests auf dem Markt
<i>Vorgehen bei positivem Test</i>	Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung nur bei Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu einer positiv getesteten Person erforderlich; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation