



Name / Geb.datum Destination(en) Impfupdate Datum		OSIR Ostschweizer Infostelle für Reisemedizin Dr. med. Gallus Heeb Allg. Innere Medizin 9000 St.Gallen	Impf- dosen Im pf- büch- lein	Impf- empfeh- lung ja nein	 wirksam bis
KINDERLAEHMUNG Poliomyelitis IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix DTPa-IPV / Infanrix DTPa-IPV+Hib Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV Tetravac DiTPa IPV Pentavac OPV alte (orale) Polio Lebend Impfstoffe	IPV Mérieux Poliorix DTPa-IPV Hib HBV dTpa-IPV dT IPV DTPaIPV -(Hib) Sabin, Salk, Poloral trivalent	ab 2019: 2 + 1 Schema (4 Dosen dTPa-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 12. Mon 4-7 Jahre 11-15J. 25J. 45J. 65J. bis 2019: 3 + 1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7J. 11-15J. 25J./45J.			
Diphtherie (D) STARRKRAMPF (T) Keuchhusten (P) Infanrix DTPa-IPV / -Hib Infanrix Hexa - , Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Tetravac (Pentavac) Revaxis „alte“ Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (-Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTpa IPV dTpa dTpa DTPa IPV (DTPa IPV Hib) dT IPV dT DTP T	25 Jahre- 65.J: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon / 4-7 Jahre 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J. 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon / 4-7 Jahre ab 5 Jahren			
ROTAVIREN Rotarix	RV1	2 Mon. / 4 Mon. (max. - 23Wo 6 Tage)	0		
Covid- 19 Moderna BioNTech/Pfizer	Auffrischimpfung für Gefährdete	Vor Reisen- IATA Vorgaben beachten https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm			
MASERN MUMPS ROETELN Priorix, MM-RVAXPRO, Pluserix früher verimpft: Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln) Masern Mumps Röteln Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö Ma Mu Rö V	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geborene Personen 2 Dosen: ab 9 Mon. / 12 Mon. bis maximal 40. Geb.tag. 2 Dosen: ab 9 Mon. / 12 Mon. bis maximal 40. Geburtstag			
WINDPOCKEN Varilrix Varivax	VZV				
FSME EncepurN EncepurN Kinder* FSME-immunCC FSME Imm.junior*	FSME Zeckenhirnhautentzündung Auffrischimpfung alle 10 Jahre	ab 12.Geb.tag 0/1-3 M/9-12 Mon ab 16. Geb.tag 0/1-3 M/5-12 Mon *Kinderdosen ab 1. Geb.tag			
HUM.PAPILLOMA VIREN Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.			
HEPATITIS B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa, Vaxelis	HBV DTP(a) Polio Hib HBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/ 6-12 Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/ 1/ 6 Mon)			
MENINGOKOKKEN Menveo MenQuadfi Bexsero Menjugate Meningotec Neis Vac	Serogruppen ACWY Serogruppe B Serogruppe C	12-18 Mon. - 5 Jahre: 1Ds Menquadfi resp. 2Ds Menveo; 11-20. Geb.tag: 1 Ds Reisen nach Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 J Impfbeginn < 12Mon: 3 Ds mit 3/5/12-18 Mon 12-23 Mon: 3 Dosen; 24-59 Mon: 2 Ds 11-20 J.: 2 Dosen Abstand 1 Mon.			
PNEUMOKOKKEN Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15	PCV13: 2, 4 und 12 Mon (- 5 Jahre) ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)			
GUERTELROSE Shingrix, Zostavax	HZ	ab 65 Jahren, 0 / 2-3 Mon.			
GRIPPEIMPFUNG		jährlich ab Oktober 1 Dosis			
GELBFIEBER Stamaril, Arilvax autorisierte Impfstelle, internat. Impfausweis	in Afrika, Südamerika nicht in Asien und Europa	1 Dosis (maximal 2 Dosen), ab vollendetem 9. Monat.			
HEPATITIS A + B Twinrix 720/20	HAV + HBV	1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12 Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)			
HEPATITIS A Havrix 1440E, Havrix 720E	HAV	ab 19 Geb.tag 2 Dosen 1440 (0/ 6 Mon.) 1.-19. Geb.tag 2 Dosen 720 (0/ 6 Mon.)			
TOLLWUT Rabipur, Tollwut Sanofi	Vor der Reise 2 Dosen (0/7-28 Tage) bei Bedarf 3. Dosis nach 12 Mon.	nach Tierbiss: 4 Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)		Tierbiss -> Arzt!	
TYPHUS Vivotif 3 Kps. Typhim vi	> 4 Wo in Hochrisikogebieten				
JAPAN. ENCEPHALITIS Ixiaro	selten empfohlen, 2 Dosen	! beschränkte Verfügbarkeit			
DENGUEFIEBER Qdenga	2 Dosen, für Reisende älter als 4 Jahre mit früher durchgemachter Dengue Erkrankung				
LINKS IMPFUNGEN MALARIA	MALARIKARTE MUECKENSCHUTZ DENGUEKARTE ZIKAKARTE YELLOW FEVER Amerika Afrika				