


OSIR Impfupdate 2019	Grund Impfungen	Empfehlungen Bundesamt für Gesundheit Bern	Anzahl Impfungen im Impfbüchlein	Impfempfehlung ja / nein	wirksam bis
<b>Kinderlähmung Poliomyelitis IPV</b>  <b>“ Mono” Impfstoff:</b> Poliorix  <b>Komb. Impfstoffe</b> Revaxis, Boostrix-Polio Infanrix Tetravac Pentavac  (früher gebraucht): Tropfen Impfstoff (Poloral) (Polio Salk) (Trivalent)	IPV  dTIPV dTPaIPV DTPaIPV DTPaIPV Hib  OPV	  (3) - 4x Anzahl variabel gemäss BAG Impf Plan in der CH: maximal 4x			
<b>Diphtherie Tetanus (Starrkrampf) Pertussis (Keuchhusten) HiB (Hämophilus influenza TypB)</b>  <b>Kombinierte Impfstoffe</b> DiphtherieStarrkrampf Keuchhusten (Hib)  Boostrix (Td pur) Revaxis Infanrix (Tetanol) Tetravac Pentavac	dTpa dT dTIPV DTPaIPV  DTPaIPVHib Hib	2. Mon; 4. Mon. und 12. – 13. Mon 4-7 Jahre   11 – 15Jahre 25 – 30 Jahre 30-65y: alle 20y			
<b>Masern Mumps Röteln-II</b> <b>Priorix MMR Vax Pro</b> Moraten Measles Vaccine Erevax	MMR	Für nach 1963 geborene: 2 Dosen im 9.Mon/ 12.Mon oder später			
<b>Hepatitis B</b> <b>Engerix B-20</b> Vax pro10  Infanrix Hexa	HBV  DTPaIPVHib HBV	bis 16.Geb.tag 2x (0/6-12Mon.) ab 16.Geb.tag 3x (0/1/6 Mon.)  3 Dosen 2.Mon-3.Geb.tag bis Ende 2018 4 Dosen			
<b>FSME Zeckenhirnhautentzündung</b> EncepurN EncepurNKinder FSME-immunCC FSME Imm.jun	FSME	ab 12.Geb.tag 3x / 1.-12.Geb.tag 3x  ab 16.Geb.tag 3x / 1.-16.-Geb.tag 3x Booster alle 10y			
<b>HPV</b> Gardasil 9   Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x Dosen 0   6 Mon.  15.- 27. Geb.tag 3 Dosen 0   1-2 Mon.   6 Mon			
<b>Varizellen</b> Varilrix Varivax Priorix Tetra	VZV	ab 12 Mon. 2x 11y -39y 2x			

<b>Meningitis durch Bakterien</b> Menveo	Men ACWY	2 Dosen ab 2. Geb.tag und von 11-15 Jahren			
<b>(Meningitis C)</b> Menjugate, Meningetec Neis VacC	MCV C	12-15Mon (-5y) 11-15y (-19y)			
<b>Pneumokokken</b> Prevenar 13	PCV	2-12Mon.(-5y) 2Mon 4Mon 12Mon bis 5y; Adulte: in spez. Situat.			

# REISEIMPFUNGEN OSIR

2019

<b>Gelbfieber</b> <i>Stamaril</i> gewisse Länder in Afrika/Südamerika im gelben Impfausweis international		ab 9 Mon. 1x max. 2x, dann Exemption Certificate		
<b>Hepatitis A</b> <i>Havrix 1440</i> <i>Havrix 720</i>	HAV	ab 19.Geb.tag 2x1440 E <sub>(0/6-Mon.)</sub> 1.-19. Geb.tag 2x 720 <sub>(0/6Mon.)</sub>		
<b>Hep A+B</b> <i>Twinrix 720/20</i>		1-16.Geb.tag 2x <sub>0/6-12Mon</sub> Ab 16.Geb.tag 3 x <sub>0/1/ 6Mon.</sub>		
<b>Typhus</b> <i>Vivotif</i>		Tag 1 3 und 5 je1 Kps		
<b>Tollwut</b> <i>Rabipur</i> <i>Tollwutimpfstoff Mérieux</i>		präexp. 2x <sub>(0/7 bis 28 Tage)</sub> bei Bedarf 3. Impfung nach 12 Mon. postexpos. 4x Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)		
<b>Meningitis</b> <i>Menveo</i> (Hadsch, für Sahelzone)	Men ACWY	ab 2. Geburtstag, alle 5y		
<b>Japan Encephalitis</b> <i>Ixiaro</i>		ab 36. Mon 2x <sub>(0/28d)</sub>		3/2019 copyright OSIR